

Женский алкоголизм... Это уже само по себе бедствие.

Недаром в народе говорится:

"Муж пьет - полдома горит, жена пьет - весь дом горит".

Алкоголь оказывает отрицательное влияние на потомство. Об этом знали еще в глубокой древности. В греческой мифологии богиня



Юнона родила от опьяневшего Юпитера хромого Вулкана. Правитель Спарты Ликург запрещал в день свадьбы употребление спиртных напитков под угрозой тяжелого наказания.

Здоровье новорожденных зависит от условий формирования половых клеток родителей, внутриутробного развития, течения

родов и, наконец, условий послеродового периода. На всех этих этапах контакт плода и новорожденного с алкоголем опасен своими физическими и психическими последствиями, причем риск уродства и заболевания тем выше, чем больше степень воздействия алкоголя на живой организм.

Состояние опьянения в момент зачатия может крайне отрицательно сказаться на здоровье будущего ребенка, так как алкоголь опасен не только для созревающих половых клеток, но может сыграть свою роковую роль и в момент оплодотворения вполне полноценных (нормальных) половых клеток. Причем сила повреждающего воздействия алкоголя в момент зачатия непредсказуема: могут быть как легкие нарушения, так и тяжелые органические поражения различных органов и тканей будущего ребенка.

Период от момента зачатия до 3 месяцев беременности врачи называют критическим в развитии плода, так как в это время происходит интенсивная закладка органов и формирование тканей. Употребление алкоголя приводит к уродующему воздействию на плод, причем повреждение будет тем сильнее, чем на более раннем этапе критического периода воздействовал алкоголь.

Употребление спиртных напитков опасно на всем протяжении беременности, так как алкоголь легко проникает от матери через плаценту по кровеносным сосудам, питающим плод. Воздействие алкоголя на плод в последующие месяцы беременности приводит к

недоношенности, снижению массы тела рожденных детей, мертворождению, уродствам.

Детородная функция у женщин, злоупотребляющих алкоголем, существенно нарушается, у них чаще наблюдаются токсикозы беременных, мертворождения, преждевременные роды, у новорожденных чаще отмечаются параличи.

При злоупотреблении алкоголем токсикозы беременных выявляются в 26 % случаев; самопроизвольные аборт - в 29,05%, перинатальная гибель плодов - в 12 %, выкидыши и преждевременные роды - в 22,32 %, тяжелые и патологические роды - в 10,5%, родовые травмы в 8 %, рождение недоношенных детей - в 34,5%, детей с проявлениями асфиксии - в 12,5%, ослабленных детей - в 19% случаев.

Кормящая мать должна помнить, что алкоголь оказывает крайне вредное воздействие на организм грудного младенца и в первую очередь на его нервную систему. Даже ничтожные дозы алкоголя, попадающие с молоком матери в организм младенца, могут вызвать серьезные нарушения в деятельности центральной нервной системы, а в отдельных случаях даже иметь необратимые последствия.

Ребенок под воздействием алкоголя становится беспокойным, плохо спит, у него могут наблюдаться судороги, а в последующем и отставание в психическом развитии. Если же кормящая мать страдает женским алкоголизмом и в организм младенца регулярно попадает алкоголь, то, помимо вышеупомянутых осложнений, у ребенка может возникнуть "синдром алкогольной зависимости грудного возраста".



последовом и раннем послеродовом периодах, а также послеродовой заболеваемости.

Все женщины, употребляющие спиртные напитки, отнесены в группу высокого риска развития патологии в родах и в послеродовом периоде. Кроме полного исключения приема алкоголя, им показана антенатальная профилактика с целью предупреждения внутриутробной гипоксии плода, слабости родовой деятельности, кровотечений в

У женщин, употреблявших алкоголь до беременности, отмечаются следующие нарушения:

- ▶ нарушения менструального цикла (например: аритмичные месячные);
- ▶ выше частота самопроизвольных абортов;
- ▶ выше частота ранних и поздних токсикозов;
- ▶ раннее отхождение околоплодных вод;
- ▶ затяжные роды;
- ▶ чаще применяются методы хирургического родоразрешения;
- ▶ большой риск развития кровопотери в родах;
- ▶ малый вес новорожденного;
- ▶ алкогольный синдром плода;
- ▶ дальнейшее отставание ребенка, как в психическом, так и физическом развитии.

Женщине нельзя пить ни грамма спиртного вплоть до того дня, когда ребенок отлучится от материнской груди.

Исключений быть не должно. Это как закон.

Женщина, готовящаяся стать матерью, должна знать, что в начале своего развития плод еще не имеет самостоятельного кровообращения и при приеме любых доз алкоголя концентрация его в крови матери и плода одинакова.



Женский алкоголизм и ребенок

